

## North West -kentän kevättyöt ja avaaminen

Talvi 2021-2022 toi näkyväksi haasteen North West -kentän viheriöiden heinälajin kanssa. Luhtarölliviheriöt kärsivät vaurioita haastavasta talvesta ja kevästä, minkä seurauksena viheriöiden tasalaatuisuus kärsi. Luhtaröllin siemeniä ei ole saatavilla, joten täydennyskylvöt joudutaan aina tekemään eri heinälajilla. Eri heinälajeilla on eri ominaisuuksia ja luhtaröllää vastaavaa lajiketta ei ole olemassa. Talvituhokohtiin kylvettiin kaudella 2022 rönsyröllää, joka käyttäytyy hoidettaessa ja pelattaessa eri tavalla kuin luhtaröllä. Käytetty lajike on sama kuin South East kentän viheriöllä.


Keväällä 2023 olemme päättäneet kylvää viheriöt kauttaaltaan rönsyröllillä, jotta pelipinnoista saataisiin tasalaatuisempia ja lajittumista viheriöiden sisällä, ja välillä, tasoitettua. Itäkkeen siemen tarvitsee sopivat olosuhteet. Matalissa lämpötiloissa itämistä ei tapahdu, joten kylvöt ajoitamme ilman lämpenemiseen. Etenkin kylmien öiden tulisi loppua.

Itäminen kestää edullisissa olosuhteissa noin kaksi viikkoa. Tuona aikana kylvettyjen siemenien tulisi pysyä tasaisen kosteana, jotta heinällä on mahdollisuus itämiseen. Olemassa oleva luhtaröllikasvusto on todella epäedullinen alusta kylvöjen tekemiselle kasvutapansa vuoksi. Tiivis kasvusto kilpailee tehokkaasti uuden heinän kanssa ja luhtaröllin paksu kuitukerros on huono itämisalusta. Viime kaudella olemme selvittäneet mahdollisuuksia kylvöille olemassaolevan luhtaröllin sekaan. Talven aikana olemme keskustelleet luhtaröllin haasteista mm. ”Tohtori rönsyröllinä” tunnetun R.H Hurleyn kanssa. Hurley tunnetaan alalla modernien viheriöheiniä jalostajana usealla vuosikymmenellä. Helppoa ja nopeaa ratkaisua tasalaatuisuuteen ei ole, mutta olemme luoneet pitkän tähtäimen toimintasuunnitelman, jota noudatamme jatkossa.

Haasteista johtuen pyrimme poistamaan viheriöiden pinnasta mahdollisimman paljon vanhaa kasvustoa, jotta tekisimme tilaa uudelle. Rungas hiekoitus parantaa mahdollisuutta maakontaktille, mikä on edellytys itämiselle. Pyrimme pitämään yllä tasaista kosteutta viheriöllä koko itämisen ajan. Siemenestä lähtenyt heinä kestää räsistä huonosti, mistä johtuen kenttä pysyy keväällä suljettuna muutamia viikkoja normaalia pidempään. Jatkossa tulemme tekemään täydennyskylvöjä muutamia kertoja vuodessa, kun olosuhteet ovat siihen otollisia.

<http://bentgrassdoctor.com/>

Lajittuneella viheriöllä luhta- ja rönsyrölliä, sekä kylänurmikkaa. Kaikilla heinillä on erilaiset ominaisuutensa pelillisesti ja hoidollisesti.



Vanhaa kasvustoa poistettu ja tehty tilaa kylvöille.



Rönsyröllin siemen on hyvin pieni. Olosuhteiden täytyy olla hyvät, jotta uusi kasvi jaksaa itää ja kehittyä.

